



SEMESTRAL

UNI

academiacesarvallejo.edu.pe

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

SEMESTRAL
UNI



Álgebra

Tema: Función inversa


Docente: Segundo Heli Chiroque Reyes

FUNCIÓN INYECTIVA O UNIVALENTE


Una función f es inyectiva si a dos elementos diferentes en el dominio, le corresponden dos elementos diferentes en el rango, es decir:

$$\text{Si } a \neq b \rightarrow f(a) \neq f(b) \quad ; \forall a; b \in \text{Dom}f$$

Ejemplo



f es inyectiva



g no es inyectiva

En forma equivalente:

Una función es inyectiva, si a cada elemento de su rango le corresponde un solo elemento del dominio.

$$\text{Si } f(a) = f(b) \rightarrow a = b \quad ; a; b \in \text{Dom}f$$

Ejemplo

Pruebe que $f(x) = \frac{3}{x-4}; x \neq 4$ es inyectiva

Resolución

Aplicación

Se define la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \langle -1; 1 \rangle$ tal que

$$f(x) = \frac{x}{1 + |x|}$$

Demostrar si f es inyectiva.

Resolución:

Nota


- Si la función f es creciente $\forall x \in \text{Dom } f$ entonces f es inyectiva.
- Si la función f es decreciente $\forall x \in \text{Dom } f$ entonces f es inyectiva.




¡Importante!

En forma gráfica, se dice que una función f es inyectiva si toda **recta horizontal**, **corta** a la gráfica de la función a lo más **en un punto**.

Ejemplo



f es inyectiva



g no es inyectiva

FUNCIÓN SOBREYECTIVA O SURYECTIVA

La función $f: A \rightarrow B$ es sobreyectiva cuando el conjunto de llegada B es el rango, es decir

$$f \text{ es sobreyectiva} \iff \text{Ran}f = B$$

Aplicación:

Dada la siguiente función $f: [1; 6) \rightarrow [1; 16)$

Tal que $f(x) = 3x - 2$, determine si la función es sobreyectiva.

Resolución:

Aplicación

Sea la función $f: \langle a; b \rangle \rightarrow [-2; 2)$ tal que

$f(x) = -\frac{1}{2}x + 1$, determine la suma de elementos enteros de su dominio.

Resolución



¡Importante!

Si en una función **no se indica el conjunto de llegada**, entonces se asume que el rango es el conjunto de llegada por lo tanto la función es **sobreyectiva**.

Ejemplo

Dada la función $f(x) = 4x^2 - 3x + 2; x \in \mathbb{R}$

Como no se indica el conjunto de llegada

→ f es sobreyectiva

FUNCIÓN BIYECTIVA

Una función f es biyectiva si es **inyectiva** y **sobreyectiva** a la vez.

Aplicación

Si $f: [1; 3) \rightarrow [2; 10)$ tal que $f(x) = x^2 + 1$.

¿ f es una función biyectiva?

Resolución

FUNCIÓN INVERSA

Sea $f = \{(x; y) / x \in \text{Dom}f, y = f(x)\}$ una función inyectiva. Se define la función inversa f^* (o también f^{-1}) como:

$$f^* = \{ (y; x) / x \in \text{Dom}f, y = f(x) \}$$

Ejemplo

Si $f = \{(1; 4) ; (2; -3) ; (-1; 0) ; (-2; 5) ; (4; 1)\}$

$\rightarrow f^* = \{(4; 1) ; (-3; 2) ; (0; -1) ; (5; -2) ; (1; 4)\}$

Se tiene que

- $\text{Dom}f^* = \{ 4; -3; 0; 5; 1 \} = \text{Ran}f$
- $\text{Ran}f^* = \{ 1; 2; -1; -2; 4 \} = \text{Dom}f$

- $f(1) = 4 \leftrightarrow 1 = f^*(4)$
- $f(2) = -3 \leftrightarrow 2 = f^*(-3)$
- $f(-1) = 0 \leftrightarrow -1 = f^*(0)$
- ⋮

Observación:

$$f = \{ (1; 2); (3; 4); (5; 4); (6; 7) \}$$

es una función **no inyectiva**, su inversa

$$f^* = \{ (2; 1)(4; 3)(4; 5)(7; 6) \}$$

no es función.

Por ello es importante la inyectividad de la función, con ello garantizamos la existencia su inversa.

Propiedades:

Sea f una función inyectiva con dominio A y rango B . La función inversa f^* cumple las siguientes propiedades.

$$1) \quad \text{Dom } f = \text{Ran } f^* \quad \wedge \quad \text{Ran } f = \text{Dom } f^*$$

$$2) \quad f(x) = y \quad \leftrightarrow \quad x = f^*(y)$$

$$3) \quad (f^*)^* = f$$

Ejemplo

$$\text{Si } f = \{(1; 4) ; (2; -3) ; (-1; 0) ; (-2; 5) ; (4; 1)\}$$


$$\rightarrow f^* = \{(4; 1) ; (-3; 2) ; (0; -1) ; (5; -2) ; (1; 4)\}$$

$$(f^*)^* = \{(1; 4) ; (2; -3) ; (-1; 0) ; (-2; 5) ; (4; 1)\}$$

$$4) \quad f \circ f^{-1} = I_B \quad \text{donde } I_B \text{ es la función identidad en } B$$

$$f^{-1} \circ f = I_A \quad \text{donde } I_A \text{ es la función identidad en } A$$

5) La gráfica de f^* es simétrica a la gráfica de f respecto a la gráfica de $y = x$



Cálculo de la función inversa (f^*)

Dado la función $y = f(x); x \in \text{Dom}f$

Para calcular la función inversa, se tiene:

1) Demostrar que f es inyectiva

2) Cálculo del $\text{Dom}f^*$

Para ello, se calcula el rango de f , porque

$$\text{Ran}f = \text{Dom}f^*$$

3) Cálculo del $y = f^*(x)$

Para ello:

- Se despeja x en función de y
- Se intercambia x con y

Aplicación

Dada la función $f: \langle -1; 4] \rightarrow B$, tal que $f(x) = 3x + 1$, halle f^* .

Resolución


Aplicación

Sea $f: \langle -\infty; 1] \rightarrow B$ una función, tal que $f(x) = x^2 - 2x + 4$; halle su inversa (si es que existe).

Resolución

PROPIEDADES:

- Si f es creciente entonces f^{-1} es creciente
- Si f es decreciente entonces f^{-1} es decreciente



Si f y g son inyectivas, y $\text{Dom}(f \circ g) \neq \emptyset$

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

— ACADEMIA —

CÉSAR

VALLEJO

GRACIAS

SÍGUENOS:   

academiacesarvallejo.edu.pe